



Définitions ?

Transsexualisme : « le sexe de l'image corporelle est en variance avec le sexe morphologique d'origine » (Money, 2004)

Selon Stoller dans *Masculin ou féminin?*

- Anatomie normale à la naissance
- Sentiment inébranlable d'appartenir au sexe opposé
- Désir d'effectuer un changement de sexe

Transsexuel primaire : Apparition du trouble de l'identité tôt dans l'enfance.

Transsexuel secondaire : Apparition plus tardive du trouble.

À ne pas confondre avec:

Transgendérisme : inadéquation entre le genre et le sexe biologique sans pour autant qu'il y est changement de sexe.

Travestisme : Port de vêtements et adoption de mimiques et d'attitudes propres au sexe opposé au sien. (Petit Larousse de la sexualité, 2007)

Hermaphrodisme : l'individu possède des tissus identifiés comme appartenant à la fois au sexe mâle et au sexe femelle.

Homosexualité : orientation sexuelle dirigé vers une personne du même sexe.



Organisme :



Association des
Transsexuels du Québec

ATQ

Internet : Administration :

www.atq1980.org admin@atq1980.org
info@atq.org 514.591.9838

Ligne d'écoute :

ecoute@atq1980.org
514.254.9038

Références bibliographiques :

CHILAND, C. (2003). *Le transsexualisme*. Paris, Presses universitaires de France. (Que sais-je, 3671). 127 p.

FRIGNET, H. (2000). *Le transsexualisme*. Paris, Desclée de Brouwer. 158 p.

Remerciements à :

Marie-Marcelle Godbout et Réal Beaudoin pour l'entrevue qu'ils nous ont accordé, Joannie Lamontagne pour sa participation au travail écrit et à Mathieu Delhorbe pour son aide graphique précieuse.



Le Transsexualisme

Travail réalisé par :

JULIE-ÉDITH GAUTHIER SABOURIN
CÉLINE MAGONTIER
RACHEL WALLISER

Théorie explicatives

Il existe des théories biologiques, psychoaffectives, sociales et médicales, etc., sur les causes du transsexualisme. Seulement, il y a tant de controverses les concernant que nous ne pouvons avoir aucune certitude sur le sujet.

Le changement de sexe

En ce qui concerne le changement de sexe, il « peut être accordé à un adulte mature et autonome, ayant une bonne insertion sociale, avec de préférence un métier. Il doit faire l'objet d'une évaluation psychopathologique prolongée par des professionnels de santé mentale formés dans ce domaine. On demande généralement une période probatoire de deux années pendant laquelle la personne candidate verra régulièrement un psychiatre. L'endocrinologue pourra éventuellement commencer la prescription d'hormones pendant la deuxième année du suivi. À la fin de la deuxième année, un chirurgien pourra entreprendre les interventions transformatrices » (Bourgeois, 2007).

Le transsexuel qui change de sexe vit différentes transformations qui lui permettent d'acquérir les caractéristiques physiques de l'autre sexe (administration d'hormone, modification des cheveux de la pilosité, de la peau et intervention chirurgicale).

Sexualité

- Le transsexuel primaire : fréquence des activités sexuelles faible; relations sexuelles dans le noir avec peu de contacts avec les organes génitaux; masturbation possible dans un contexte où l'imaginaire est très présent.

- Le transsexuel secondaire: rapports sexuels hétérosexuels ou homosexuels dans le passé; orgasme obtenu grâce à la prévalence de l'imaginaire.

Après l'opération des organes génitaux, parvenir à l'orgasme par la seule stimulation génitale sera possible. Néanmoins son obtention nécessitera un peu plus de temps, (Godbout, 2008)

Selon la sexoanalyse, le transsexualisme n'entre pas dans les critères de santé sexuelle générale.

Présentation de :

Christine Jorgensen : En 1952 au Danemark la première opération de changement de sexe a été performée sur la personne de George Jorgensen, ex-GI de l'armée américaine. Georges est devenu Christine, prénom choisi en hommage à Christian Hamburger le chirurgien qui l'opéra. Le cas de Christine Jorgensen est le premier à avoir été largement médiatisé.



Coccinelle : En 1958, Jacques-Charles Dufresnoy se fait opéré par le Docteur Georges Burou à Casablanca et devient Jacqueline-Charlotte Dufresnoy surnommée Coccinelle. Cette dernière est la figure de proue du transsexualisme français et a permis de faire connaître le phénomène.



Thomas Beatie : Mars 2008, premier homme enceint. On parle en fait de Thomas Beatie, un transsexuel (FM) ayant gardé ses organes de reproductions internes et externes. Il a donné naissance à son premier enfant le 29 juin 2008 et a annoncé le 13 novembre qu'il attendait son deuxième enfant.



Place et rôles du sexologue bachelier

L'intervention bachelière prend place surtout après le changement de sexe. Le sexologue peut aider à développer la vie sexuelle de l'individu en tant qu'homme ou femme ainsi que l'estime de soi sexuelle, le tout sur une base plus solide. Dans le cas d'individus déjà en couple avant l'opération, il s'agit de les épauler de façon à ce que la redécouverte de l'autre se fasse le plus paisiblement possible (Beaudoin, 2008).

Par ailleurs, le sexologue bachelier peut aussi jouer un rôle important dans la sensibilisation du public face à la problématique transsexuelle (dépliants, conférences, dialogue, témoignages, etc.). De même, celui-ci peut participer à la création et à l'animation d'organismes d'information et d'aide pour les transsexuels et leur entourage (écoute et information).